



Roublot

Vass3R07s176-180





Collection Vassal-Montpellier

227Mtp2


Handwritten notes:
cl 3 - 17 - 18 - 19 - 20
Roublot

Handwritten on paper insert:
cl 4 Pl 17 A 4

Handwritten on paper insert:
Roublot







Désignation *Roublot*
Clos 4 Planche 17 Côté A N° 4
Vigueur : 2
Date de maturité 14.8.61
Charge P.1

S. 10

24

*

*

*

Désignation : *Roublot*
Clos 4 Planche 17 Rang A Souche 4
Vigueur : 2 *Bun V 31.7.62*
Date de Maturité : 13.8.62
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) *tes*
BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
S 2 2 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obov - cyl - fus.
s *
s * avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Roublot*
Clos 4 planche 17 - Rang A4 Souche
Vigueur : 1 1/2
Date de Véraison : 30.7.63
Date de maturité : 19.8.63
Pourriture : 4 +1
GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 20

saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 7 disc. - sph. - (ell) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 15 avec pépins - ~~apyrène~~
s *
s * jus : inc. - ~~coloré~~

*souche différente → s 5 1/2
lot 12375 à arracher*

Désignation : *Roublot*
Clos 6 Planche 17 Rang A Souche 4
Vigueur :
Date de Véraison : 30.7.64
Date de Maturité : *min le 24.8.64*
Pourriture : *condensé de purification*
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 18 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 18 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 Obov. - cyl. - fus.
s *
s * avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1960

N° : 426 PL 1774 / Planche Raullet

Côté

	Nombre		D A T E S									
	Total	9/3										
1	4	3	*									
2	4	1										
3												
4												
5												

De 9 3-60x

Année : 1961

Raullet

Emplacement : CL 4 PL 17 A 4

	Nombre		D A T E S									
	total	6 3 9 3										
1	4	1	3	*								
2	5	1	4	*								
3												
4												
5	faill											
6												
7												
8												
9												
10												

De 8.3-61x

-2

Année 1962

Roublot

N° Planche cl 4 P 17 A 4 Côté

		Nombre	D A T E S									
		total										
			30,3	5,4								
T. cl. 17 A 4	1	5	1	4	x							
	2	7	1	5	x							
	3											
	4											
	5	4	1	2	x							

D 2 5.4 62x +2

Année : 1963

Emplacement 4.17 A 4 Désignation Roublot

		Nombre	D A T E S									
		total										
			21,3	26,3	1,4	5,4						
T L 1	11	2	4	7	x	10						
T L 2	17	0	2	4		11x						
X												
X												
T L 5	11	0	0	0		4						

D 2 3-4-63x -2

Roublet

Désignation :

VASSAL Celi Planche 17 Côté A N° 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) ¹⁵ - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes le 20.5.58

N° ordre

Désignation :

Raiblot

VASSAL *Blh* Planche *17* côté *A* N° *4* souche : (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 6 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Raillot

VASSAL *Cl* Planche *17* côté *A* N° *4* Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Remy G

N° ordre

Désignation

Raillot

VASSAL *bl 4* Planche *17* côté n° *4* 4 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6).
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) *parfois*
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Annex 61

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 224 Planche 17 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Remes Roux 1961

Dénomination Raublot
Planche côté Rang 4.17.A.4... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renne 11/62

N° d'ordre : 0227-02 Désignation : Roublot
Origine :
Emplacement : 4. 17A4. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ④ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ② - ③ - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 1 - ② - ③.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Banc 61

10/03/08

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 227 Observateur :
Code cépage : 227-2 Code introduction :
Nom introduction : Roublot Emplacement : BR7 176-180

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

0603

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		18/3	11	
2	8		11/3	3	
3	\		\	\	
4	4	11/3	15/3	5	
5	6		17/3	10	
Moyenne	24		15/3	29	12

+5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
18/5	23/5		17/07	25/07	13/08	

DF proche 13/5
16/5 une fleur ouv. 25/5

-1

0

0

Formulaire de description 5 / 8
(stade maturité)

Année : 2008

Observateur : SL

Code cépage : 227-2 Code introduction :

Nom introduction : Roublot

Emplacement : 3R7 s 176-180

peu de matériel / moyen par
les six ou

Grappe

oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 -
longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 11,5 cm

oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 -
large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 7 cm

oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 -
long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. 3,5 cm

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208 forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3.

oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3.

Baie

oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue
(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 14 mm (13)

oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large
(20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 12 mm

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3.

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -
cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jauné 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2.

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent 2.

oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1 - colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -
forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2.

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long
(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 5-6 mm

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6 mm

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -
moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2.

Vassal : 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 - coloré 1.

000-18 région ombilicale : déprimée 1 - non déprimée 2.

Millerandage : nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9.